

# Concurso Público

## Secretaria de Saúde do Recife



Secretaria de Saúde do Recife



PREFEITURA DO  
**RECIFE**

# ENFERMEIRO

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo ( **●** ).  
**A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo.**
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

**Nome:**

**Inscrição:**

**Identidade:**

**Órgão Expedidor:**

**Assinatura:**

**COMISSÃO DE PROCESSOS  
SELETIVOS E TREINAMENTOS**

Fone: (0XX81) 3231-4000

Fax: (0XX81) 3231-4232



## TEXTO 1

### O CONTROLE SOCIAL E POLÍTICO DO ÁLCOOL

A história mostra vários exemplos de que as sociedades já há muito tempo vêm buscando defender-se de alguns produtos. Talvez o controle social e político do consumo de álcool seja um dos exemplos mais antigos de que as sociedades buscaram proteger-se dos seus efeitos sociais.

Todos os países desenvolvidos, onde a democracia prosperou, buscaram formas de proteger a sociedade, aumentando o controle social da produção, importação, distribuição, propaganda e venda direta ao consumidor do álcool. Mesmo países como os EUA, que têm uma forte tradição de livre comércio, exercem um rígido controle social com relação a esse produto. O grande argumento para esse controle especial é o seu alto custo social, que faz com que o álcool seja considerado como um produto à parte e que não deve ser comercializado de uma forma banal.

No Brasil, existe um argumento liberal de que a oferta e a demanda do álcool devem ser algo que o próprio mercado precisa regular, e de que aqui já temos controle em demasia. Além disso, seria pouco democrático fazermos controle de um produto que é legalizado. No entanto, são exatamente os países mais desenvolvidos do ponto de vista democrático que aumentam a cada dia o controle social sobre o álcool. Busca-se balancear o interesse da indústria de bebidas com o interesse da sociedade em proteger-se dos danos causados por ele.

A vergonha de exercermos o controle social associada a uma grande apatia de política de saúde tem tornado o álcool, no Brasil, um produto com um alto custo social, pois sua demanda tem sido fortemente estimulada pela propaganda, pelos baixos preços e pela excessiva oferta nos pontos de venda. Especialmente a propaganda do álcool se apossou de vários ícones nacionais para criar a idéia de que só podemos nos divertir com um copo de cerveja na mão. Como não temos uma política de licença para a venda de álcool, qualquer pessoa pode abrir um bar e vender bebidas alcoólicas. Esse fato tem mudado a paisagem e a cultura urbana brasileira. Estamos acostumados a ter bares espalhados por todas as cidades, como se isso sempre tivesse existido, e fosse normal.

As leis são poucas e não são cumpridas. Essa falta de controle tem produzido um custo social enorme para o país: cerca de 15% da população adulta masculina bebe de forma abusiva; uma parte significativa das crianças abandonadas tem no álcool a causa da desorganização familiar; metade dos acidentes automobilísticos é devida ao abuso de álcool; mais da metade dos homicídios estão relacionados ao seu consumo. Do ponto de vista da saúde, 20% das internações em clínica geral e 50% das internações masculinas psiquiátricas são devidas ao álcool.

A sociedade brasileira está pagando um alto preço pela falta de proteção com relação a esse produto. Precisamos, com urgência, convencer a sociedade e o mundo político de que o controle do álcool é uma garantia de que o bem comum deve prevalecer sobre o da indústria.

Ronaldo Laranjeira. Artigo publicado no site [www.diganaoasdrogas.com.br](http://www.diganaoasdrogas.com.br). Adaptado.

**01.** O principal argumento apresentado no texto 1 para a defesa do controle social e político do álcool no Brasil é o de que:

- A) a história tem mostrado que a sociedade brasileira vem dando sinais de que anseia defender-se de alguns produtos e de que busca proteger-se dos seus efeitos sociais.
- B) é importante que o Brasil mostre para a sua sociedade que é um dos países em que a democracia prosperou, e que por isso a população pode sentir-se protegida.
- C) é preciso mudar o argumento liberal de que a oferta e a demanda do álcool devem ser algo que o próprio mercado precisa regular e de que aqui já temos controle em demasia.
- D) para garantir a estabilidade democrática, o país precisa buscar o balanceamento entre o interesse da indústria de bebidas alcoólicas e o interesse da sociedade.
- E) o fato de não exercermos o controle social sobre o álcool aliado a uma frágil política de saúde tem feito com que esse produto tenha um alto custo social no país.

**02.** Seguindo a linha argumentativa do texto 1, qual a medida mais eficaz que representaria controle social e político do álcool, em nosso país?

- A) Liberação das importações de bebidas alcoólicas.
- B) Censura às propagandas de bebidas alcoólicas.
- C) Diminuição de impostos para indústrias que produzem bebidas alcoólicas.
- D) Proibição de abertura de novos bares onde já há excesso deles.
- E) Campanhas publicitárias contra o consumo de álcool por menores.

**03.** Analise as relações semânticas presentes nos seguintes enunciados:

- 1) No Brasil, as leis sobre o consumo de álcool são poucas, ainda que a história mostre exemplos de que a sociedade vem buscando defender-se de alguns produtos. (CONCESSÃO)
- 2) Precisamos convencer a sociedade e o mundo político de que é importante controlar o consumo de álcool, a fim de que o bem comum prevaleça sobre o da indústria. (FINALIDADE)
- 3) Os países mais democráticos vêm aumentando o controle social sobre o álcool, objetivando balancear o interesse da indústria de bebidas com o interesse da sociedade em proteger-se. (CONCLUSÃO)
- 4) Como não temos uma política de licença para a venda de álcool, qualquer pessoa pode abrir um bar e vender bebidas alcoólicas, fato que tem mudado a paisagem e a cultura urbana brasileira. (COMPARAÇÃO)

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 3, apenas.
- B) 2 e 4, apenas.
- C) 3 e 4, apenas.
- D) 1 e 2, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

## TEXTO 2

Minha principal convicção hoje é que o alcoolismo é um problema de dimensões trágicas ainda subdimensionadas. O maior dano do alcoolismo é a destruição de famílias inteiras.

O alcoolismo é resultado de um cérebro que perdeu a capacidade de decidir quando começar a beber e quando parar. Os japoneses têm um provérbio que diz: "Primeiro o homem toma uma bebida, e depois a bebida toma o homem". O indivíduo alcoólatra é alguém que perdeu a liberdade de escolha.

George Vaillant (coordenador da maior pesquisa já feita no mundo sobre o alcoolismo).  
Fragmento de entrevista à Veja, publicada no site [www.alcoolismo.com.br](http://www.alcoolismo.com.br)

**04.** De acordo com o texto 2, o alcoolismo caracteriza-se por:

- A) ser um problema cuja abrangência ainda não foi mensurada com exatidão.
- B) suas consequências restringirem-se ao indivíduo que bebe.
- C) atingir o cérebro do indivíduo, embora com preservação de sua saúde emocional.
- D) assegurar, à pessoa por ele acometida, a capacidade de autocontrolar-se.
- E) atingir mais gravemente a população japonesa, que manifesta o problema através de provérbios.

**05.** Comparando-se as características dos textos 1 e 2, pode-se afirmar que:

- 1) São do mesmo gênero textual, embora tipologicamente diferentes.
- 2) Segmentos narrativos, presentes em ambos os textos, asseguram sua coerência.
- 3) Nota-se, em ambos, a opção por seguir a variante padrão da língua.
- 4) As várias marcas da oralidade presentes em ambos os textos indicam que eles são informais.

**Estão corretas:**

- A) 1, 3 e 4, apenas.
- B) 3, apenas.
- C) 1 e 2, apenas.
- D) 2 e 4, apenas.
- E) 1, 2, 3 e 4.

## Conhecimentos do Sistema Único de Saúde (SUS) / Saúde Coletiva

**06.** O Art. 198 da Constituição Federal refere à descentralização como uma das diretrizes do Sistema Único de Saúde. Na perspectiva da gestão municipal da saúde, o Recife é dividido em:

- A) 4 distritos sanitários.
- B) 5 distritos sanitários.
- C) 6 distritos sanitários.
- D) 7 distritos sanitários.
- E) 8 distritos sanitários.

**07.** A Lei Orgânica da Saúde (Lei 8080, de 19 de setembro de 1990) recomenda o uso da epidemiologia para o estabelecimento de prioridades, a alocação de recursos e a orientação programática do Sistema Único de Saúde. O primeiro momento do processo de planejamento que usa dados e informações epidemiológicas para conhecer a situação de saúde-doença de uma determinada população é denominado:

- A) diagnóstico.
- B) normativo.
- C) operacional.
- D) tático.
- E) estratégico.

**08.** A Norma Operacional da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/2001 – estabelece as responsabilidades do gestor municipal, os requisitos relativos às modalidades de gestão e as prerrogativas que favorecem o seu desempenho. Segundo essa norma, os municípios podem habilitar-se nas condições de:

- A) Gestão Incipiente da Atenção Básica Ampliada e Gestão Parcial do Sistema Municipal.
- B) Gestão Semiplena da Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal.
- C) Gestão Plena da Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal.
- D) Gestão Parcial da Atenção Básica Ampliada e Gestão Semiplena do Sistema Municipal.
- E) Gestão Incipiente da Atenção Básica Ampliada e Gestão Plena do Sistema Municipal.

**09.** Embora haja referências de ocorrência de epidemias de Dengue no Brasil desde o século XIX, a primeira delas, documentada clínica e laboratorialmente, foi registrada em Boa Vista (RO), entre 1981-1982. Em relação às características epidemiológicas da Dengue, é incorreto afirmar que:

- A) o mosquito *Aedes aegypti* é a espécie mais importante na transmissão da doença no Brasil.
- B) a Dengue é uma doença contagiosa de etiologia viral, sujeita à notificação compulsória em todo o território nacional.
- C) considera-se caso suspeito de Dengue clássica o paciente que apresente doença febril aguda, com duração máxima de sete dias, acompanhada de pelo menos dois dos seguintes sintomas: cefaléia, dor retroorbital, mialgia, artralgia, prostração, exantema. Além desses sintomas, deve ter estado, nos últimos quinze dias, em área onde esteja ocorrendo transmissão da doença ou tenha a presença do vetor.
- D) a dispersão geográfica e a elevada densidade do principal vetor da Dengue estão favorecendo o risco de reurbanização da Febre Amarela no Brasil.
- E) a detecção precoce e o controle das epidemias constituem objetivos da vigilância epidemiológica da doença.

**10.** Nos primeiros anos da década de 2000, o Recife ainda apresenta um perfil epidemiológico misto, em que se sobrepõem características de países desenvolvidos e subdesenvolvidos. Em relação a esse perfil, é correto afirmar que, no Recife:

- A) as doenças infecciosas e parasitárias, considerando todos os óbitos, constituem a primeira causa de morte.
- B) a primeira causa de óbito na faixa etária de 10 a 19 anos são os acidentes de transportes.
- C) o câncer de colo uterino é a primeira causa de óbito por neoplasia entre mulheres.
- D) a primeira causa de óbito no sexo feminino são as doenças do aparelho circulatório.
- E) as neoplasias malignas representam a segunda causa de óbito entre homens.

**11.** “Um conjunto de ações que proporcionam o conhecimento, a detecção ou prevenção de qualquer mudança nos fatores determinantes e condicionantes de saúde individual ou coletiva, com a finalidade de recomendar e adotar as medidas de prevenção e controle das doenças ou agravos”. Esse texto, extraído da Lei Orgânica da Saúde, se refere à:

- A) vigilância entomológica.
- B) vigilância sanitária.
- C) vigilância epidemiológica.
- D) vigilância clínica.
- E) vigilância ocupacional.

**12.** Sobre o comportamento da mortalidade infantil no Recife, nos primeiros anos da década de 2000, é correto afirmar que:

- A) a primeira causa de morte em menores de um ano são as doenças diarreicas.
- B) as broncopneumonias constituem a primeira causa de óbito em menores de um ano.
- C) a taxa de mortalidade neonatal é maior do que a pós-neonatal.
- D) as afecções perinatais constituem a segunda causa de morte em menores de um ano.
- E) a magnitude da taxa de mortalidade infantil ultrapassa 40 óbitos por 1000 nascidos vivos.

## Conhecimentos Específicos

**13.** Sobre a ressuscitação cardiopulmonar, pode-se afirmar que:

- A) a adrenalina é usada para acelerar a frequência cardíaca.
- B) o bicarbonato de sódio é usado para corrigir a hipoxemia.
- C) a atropina aumenta a pressão de perfusão, durante as compressões cardíacas
- D) o gluconato de cálcio é usado nos estados de hiperpotassemia e intoxicação por bloqueadores de cálcio.
- E) a lidocaína é usada para corrigir acidose metabólica e respiratória.

**14.** Em relação às características, indicação, vantagens e desvantagens dos curativos sintéticos no tratamento de feridas, assinale a alternativa correta.

- A) O curativo de carvão ativado e prata é indicado para uso em tumores abcedados e doenças oncológicas em atividade e ferida com tecido necrosado.
- B) O curativo de hidrocolóide tem como característica manter o meio ambiente da ferida seco, propiciando barreira contra infecção.
- C) O curativo de hidrogel é indicado para feridas com baixo exsudato, queimaduras de 1º e 2º graus e em feridas em fase de granulação.
- D) O alginato de cálcio é indicado para ferida sem exsudato, com presença de tecido necrótico e em cavidades profundas.
- E) O curativo de carvão ativado e prata tem a vantagem de dispensar o uso de curativo secundário.

**15. Sobre a Decisão COREN-PE Nº003/94 no Artº 1, assinale a alternativa correta.**

- A) O Pessoal de Enfermagem está autorizado a confeccionar, colocar e/ou retirar aparelho de gesso e calha gessada.
- B) O Pessoal de Enfermagem está terminantemente proibido de confeccionar, colocar e/ou retirar aparelho de gesso e calha gessada.
- C) O Pessoal de Enfermagem está autorizado a confeccionar, colocar e/ou retirar aparelho de gesso e calha gessada, mediante supervisão médica.
- D) O Pessoal de Enfermagem, excetuando-se o Enfermeiro, está terminantemente proibido de confeccionar, colocar e/ou retirar aparelho de gesso e calha gessada.
- E) O Pessoal de Enfermagem, desde que devidamente treinado, está autorizado a confeccionar, colocar e/ou retirar aparelho de gesso e calha gessada.

**16. Com relação a acidentes embólicos, assinale a alternativa correta.**

- A) Os locais mais comumente atingidos são os pulmões, as artérias coronárias, o mesentério, as extremidades, os rins e o cérebro.
- B) Há ausência de alterações pupilares, tal como ocorre no acidente vascular cerebral.
- C) Deve-se manter o paciente com as pernas cruzadas, para evitar o desprendimento de um coágulo.
- D) O paciente apresenta sintomas de agitação, cianose periférica, distensão venosa, edema e ascite.
- E) A embolia é resultado da fragilidade tecidual, do traumatismo dos tecidos ou de uma anomalia na coagulação.

**17. Sobre a Malária, assinale a alternativa correta.**

- A) É uma infecção parasitária produzida por quatro espécies de *Plasmodium*.
- B) A vacina antimalária apresenta ação prolongada, com 90% de eficácia.
- C) A infecção humana começa com a picada do macho do anofelino.
- D) O desenvolvimento inicial dos parasitas da Malária se faz no interior do baço humano.
- E) As manifestações clínicas têm início com um intenso calafrio e elevação térmica, que atinge 40º a 41ºC.

**18. Sobre a Hepatite por vírus B, assinale a alternativa correta.**

- A) A transmissão ocorre pela via fecal-oral e parenteral.
- B) O período médio de incubação é de 15 dias, variando entre 10 e 25 dias.
- C) É produzida por um vírus pouco resistente a condições ambientais.
- D) É tanto um risco ocupacional quanto nosocomial em hospitais e clínicas médicas.
- E) Sua evolução clínica é caracterizada pela ausência das fases pré-ictéricas e ictéricas.

**19. Sobre as complicações agudas do Diabetes, assinale a alternativa correta.**

- A) A hipoglicemia e a cetoacidose podem produzir coma hiperosmolar no diabético.
- B) Com a queda da glicose sanguínea o sistema nervoso parassimpático é estimulado a produzir adrenalina.
- C) A retinopatia diabética é uma das complicações agudas que acometem os portadores de Diabetes.
- D) A cetoacidose diabética é devida à grande quantidade de insulina no organismo, que resulta em hiperglicemia.
- E) As manifestações clínicas na cetoacidose são caracterizadas pela glicose sanguínea baixa e o bicarbonato sérico aumentado.

**20. Sobre a obstrução intestinal, assinale a alternativa correta.**

- A) A obstrução do intestino delgado é clinicamente igual a do intestino grosso.
- B) O sintoma inicial é uma dor tipo cólica, presença de vômito e ausência de matéria fecal.
- C) A ausência de peristalse resulta em contração do intestino pelo gás produzido pela decomposição do conteúdo intestinal.
- D) A obstrução do intestino grosso reduz a absorção dos líquidos e estimula a secreção gástrica.
- E) O risco de estrangulamento intestinal (morte do tecido) só é observada na obstrução do intestino grosso.

**21. Sobre os distúrbios da função respiratória, assinale a afirmativa correta.**

- A) A oxigenoterapia é a administração de oxigênio a uma concentração e pressão menores que as encontradas no meio ambiente.
- B) Oxigênio excessivo pode produzir efeitos tóxicos nos pulmões e no sistema nervoso central.
- C) O sinal clínico mais importante para a hipóxia é a cianose de extremidades.
- D) A confusão, obnubilação e elevação da pressão sanguínea só aparecem na hipoxemia grave.
- E) O oxigênio fornecido ao paciente não deve ser umidificado, pelo risco inerente de infecção viral e bacteriana.

**22. Sobre os aspectos do gerenciamento dos resíduos de serviço de saúde, assinale a alternativa correta.**

- A) O gerenciamento é de inteira responsabilidade do Poder Público Municipal.
- B) A Resolução Nº 5 está em processo de tramitação para definir normas mínimas.
- C) Estão classificados em quatro grupos A,B,C,D, dependendo do risco potencial à saúde pública e ao meio ambiente.
- D) Todo resíduo proveniente de Serviços de Saúde deverá ser acondicionado em saco branco com simbologia do infectante.
- E) No Grupo C enquadram-se as drogas quimioterápicas, resíduos farmacêuticos, tóxicos e reativos.

**23. Em relação à Sondagem Nasogástrica e Entérica, assinale a alternativa correta.**

- A) Antes e após dieta por sonda, devem ser aplicados 20 a 30ml de água para garantir a permeabilidade, oclusão e redução de crescimento bacteriano.
- B) Na retirada da SNE deve-se colocar o paciente em Trendelenburg, prevenindo assim aspiração acidental de conteúdo gástrico para o pulmão.
- C) A SNG aberta é usada para medir e avaliar o conteúdo gástrico e alimentar o paciente impossibilitado por anomalia orgânica.
- D) Pode ocorrer constipação se a dieta for administrada fria ou muito rápida, ou se existir contaminação bacteriana.
- E) A SNG fechada é usada para aliviar o estômago do conteúdo gástrico indesejado e para limpá-lo das drogas ingeridas em excesso.

**24. Em relação à área física do Centro Cirúrgico, assinale a alternativa correta.**

- A) A desvantagem do uso da cloroheixidina é a sua inativação na presença de matéria orgânica.
- B) As vantagens do uso dos iodóforos são o baixo custo e a duração do efeito residual por mais de 6 horas.
- C) Os anti-sépticos indicados para degermação das mãos são as soluções iodadas, cloroheixidina, e hexaclarofeno.
- D) A flora transitória é composta pelos principais microorganismos causadores das infecções hospitalares.
- E) Na degermação das mãos a flora microbiana residente é totalmente destruída.

**25. Sobre a esterilização, assinale a alternativa correta.**

- A) Os órgãos regulamentadores indicam a esterilização Ultra-rápida (tipo flash) para os artigos implantáveis.
- B) Em autoclave é recomendado montar a carga com os pacotes compactados, para redução de custos.
- C) A esterilização pelo vapor saturado sob pressão é o mais econômico, seguro e conhecido método de esterilização.
- D) O processo pelo plasma de peróxido de hidrogênio é indicado para artigos contendo celulose.
- E) Os sistemas de monitoração física, química e biológica não são necessários na esterilização pelo vapor saturado sob pressão.

**26. No atendimento a adolescente vítima de violência sexual, assinale a alternativa correta.**

- A) Exame físico com exame ginecológico deve ser realizado somente em maiores de 18 anos.
- B) Não se deve fazer encaminhamento à delegacia de polícia para não constranger a vítima.
- C) É necessário registrar lesões ocorridas somente nos órgãos genitais.

- D) Deve-se prevenir a gravidez indesejada, através de contracepção de emergência.
- E) Deve-se orientar o adolescente para se lavar, prevenindo assim possível doença sexualmente transmissível.

**27. Sobre as vacinas preconizadas pelo Programa Nacional de Imunização, é correto afirmar que:**

- A) a vacina contra a Hepatite-B é contra-indicada para recém-nascidos.
- B) a vacina contra *Haemophilus Influenza-B* é composta de polissacarídeo capsular purificado, conjugado à proteína.
- C) na vacina contra a Poliomielite, os eventos adversos mais freqüentes são calor, rubor e endureção.
- D) a vacina contra *Pneumococo* deve ser congelada, para não perder a capacidade de imunização.
- E) a via de aplicação da vacina contra a Difteria-Tétano-Coqueluche é subcutânea.

**28. Em relação à finalidade, resultados esperados, principais metas, avaliação de enfermagem e considerações especiais no cateterismo vesical, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:**

- A) A finalidade é facilitar a eliminação vesical, avaliação da quantidade de urina residual, avaliação contínua da diurese e uma via para irrigação da bexiga.
- B) Entre as principais metas, o paciente deve conseguir e manter uma produção urinária de pelo menos 250ml por período de 6 horas.
- C) É esperado que o paciente verbalize alívio da dor no abdome inferior no prazo de uma hora após cateterização vesical.
- D) A avaliação da enfermagem deve enfatizar o tipo de cateterização prescrito.
- E) Quando a sonda vesical é usada por tempo prolongado, há uma redução ao risco de infecção, mas deve-se atentar para sinais e sintomas precoces de infecção.

**29. Com relação aos traumatismos musculoesqueléticos, assinale a alternativa correta.**

- A) Luxação é uma lesão das estruturas ligamentares que circundam uma articulação.
- B) Distensão é uma afecção na qual as superfícies articulares dos ossos que formam a articulação deixam de estar em contato anatômico.
- C) Entorse é uma lesão dos tecidos moles, produzida por uma força contundente, tipo queda.
- D) Contusão é uma laceração muscular microscópica, devida à hiperdistensão ou ao estresse.
- E) A fratura completa consiste numa quebra em toda a área transversal do osso, com desvio da posição anatômica.

**30. Sobre a assistência de enfermagem a pacientes com distúrbios da função respiratória, assinale a alternativa correta.**

- A) A extensão da cabeça é a maneira mais simples de aliviar a obstrução da via aérea superior, causada pela queda da língua.
- B) Na ausculta do tórax, os ruídos respiratórios estertores, como ronco, indicam ausência de infecção ou inflamação.
- C) Na avaliação dos volumes pulmonares, quando o volume corrente está acima de 10ml por Kg de peso corporal, a ventilação é requerida.
- D) A expiração causa a retração de pontos superiores do tórax, esterno e espaços intercostais.
- E) A respiração acelerada está associada à elevação da pressão intracraniana, com lesão cerebral, e a lenta é vista no edema pulmonar e na acidose metabólica.

**31. Entre os aspectos da Vigilância Sanitária, assinale a alternativa correta.**

- A) A construção ou reforma de estabelecimentos de saúde privados não necessitam de aprovação da VS, para execução da sua obra.
- B) O Código Sanitário responsabiliza o proprietário pela qualidade dos serviços e produtos, e pelos danos que possam causar a população e ao meio ambiente.
- C) Somente os produtos médico-hospitalares necessitam de registro, emitido pela Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.
- D) A inspeção sanitária é um ato de fiscalização para cumprimento de normas técnicas dos produtos, aplicadas exclusivamente para fármacos e gêneros alimentícios.
- E) É de competência dos municípios promover a descentralização dos serviços de ações de saúde de Vigilância Sanitária.

**32. No controle de paciente com distúrbio cardiovascular, é correto afirmar que:**

- A) confusão mental, excitação, náuseas e parestesia das extremidades são efeitos observados na hipocalcemia.
- B) arritmias, intoxicação digitalica e alcalose metabólica são efeitos observados na hipercalemia.
- C) é importante observar a mucosa bucal, leitos ungueais, lábios e extremidades quanto à palidez e cianose, que são sinais de baixo débito cardíaco.
- D) dormência e formigamento dos digitais, orelha e nariz e câibras musculares são observados na hipercalemia.
- E) pressão venosa central baixa é uma indicação de hipervolemia, observada nos distúrbios da coagulação sanguínea.

**33. Sobre a assistência das disfunções neurológicas, podemos afirmar que:**

- A) na avaliação da Pressão Intracraniana os sinais vitais alterados são eventos mais importantes que as alterações no nível de consciência.
- B) o sinal mais precoce de uma pressão intracraniana crescente é a letargia. É importante observar demora na resposta a sugestões verbais.
- C) a temperatura corporal mantida acima do normal diminui o edema cerebral, protegendo-o de isquemia contínua.
- D) a indução e a manutenção da hipertemia na PIC é um procedimento clínico importante e exige conhecimento da enfermagem.
- E) agitação, cefaléia e respiração forçada são sinais e sintomas tardios de pressão intracraniana aumentada.

**34. No controle de paciente com disfunção renal, assinale a alternativa correta.**

- A) Mucosas secas e pegajosas, sede e língua seca indicam redução de sódio no líquido extracelular.
- B) Anorexia, distensão gasosa dos intestinos, íleo paralítico são sinais de aumento do potássio no líquido extracelular.
- C) Câibras abdominais, convulsões e oligúria são sinais de sódio aumentado no líquido extracelular.
- D) Dor óssea intensa e hipotonicidade muscular indicam déficit de cálcio no líquido extracelular.
- E) Perda crônica de peso, palidez, fadiga e músculos flácidos indicam déficit de proteína no líquido extracelular.

**35. Sobre vias de administração e diluição de drogas, assinale a alternativa correta.**

- A) Azactam – Pode ser administrado pelas vias intramuscular e intravenosa.
- B) Cipro injetável – Não pode ser administrado diretamente na veia.
- C) Clexane – Administração recomendada somente pela via intramuscular.
- D) Nipride – Diluição para infusão somente em soro fisiológico a 0,9%.
- E) Tienam – Diluição para infusão exclusivamente em soro glicosado 10%.

**36. Ocorre interação medicamentosa em:**

- A) Nembutal x Omeprazol.
- B) Tetraciclina x Ciclosporina.
- C) Clorpropamida x Ranitidina.
- D) Ciprofloxacina x Teofilina.
- E) Digoxina x Sulfametoxazol.

**37. Na relação entre enfermagem e paciente com comportamento agressivo, o enfermeiro deve:**

- A) tratar o paciente com hostilidade e indiferença.
- B) ignorar o paciente, pois o comportamento dele incomoda.
- C) entender que a agressividade é a maneira que o paciente encontrou para enfrentar a doença.
- D) evitar conversar com o paciente e transferir a responsabilidade para a família.
- E) entregar-se à retaliação ou ao afastamento.

**38.** Sobre o Programa Saúde da Família, assinale a alternativa correta.

- A) As equipes serão compostas por um médico, um enfermeiro, um dentista e um assistente social.
- B) O PSF foi implantado em 1996, prioritariamente nas áreas delimitadas no mapa da fome do IPEA.
- C) O processo de recrutamento e seleção será coordenado exclusivamente pelos níveis estadual e federal.
- D) As equipes de saúde não devem fazer encaminhamento para consultas com especialistas nos ambulatórios da rede do SUS.
- E) O Ministério da Saúde firmará com cada Unidade da Federação um convênio de adesão ao PSF.

**39.** A assistência psiquiátrica vem sofrendo alterações, ao longo dos anos. Sobre as características de cada época, assinale a alternativa correta.

- A) Século XVI – Tolerância da sociedade à loucura.
- B) Século XVII – Institucionalização da loucura.
- C) 1991 – Extinção gradativa dos hospitais psiquiátricos brasileiros.
- D) Século XX – Desacorrentamento dos loucos.
- E) Década de 60 - Inspiração no sistema da Itália.

**40.** Sobre os Estudos Epidemiológicos nos Serviços de Saúde, é correto afirmar que:

- A) são indispensáveis para o diagnóstico de saúde de uma comunidade.
- B) têm pouca influência na avaliação da utilização dos Serviços de Saúde.
- C) programas de atenção primária pouco contribuem para os Serviços de atenção à saúde.
- D) os fatores socioeconômicos não são levados em consideração sobre o impacto de saúde/doença.
- E) a taxa de mortalidade infantil não se aplica aos estudos epidemiológicos.

**41.** Quanto à ingestão de álcool e danos orgânicos, assinale a alternativa correta.

- A) A ingestão alimentar adequada protege o alcoolista de complicações orgânicas.
- B) O álcool ingerido só causa lesão no fígado e no baço.
- C) A ingestão prévia de leite ou gordura não dificulta a absorção do álcool.
- D) O álcool penetra em todos os tecidos, podendo causar lesões em qualquer órgão.
- E) A ingestão de álcool não interfere na inibição da síntese protéica.

**42.** Em que década a violência contra a mulher passou a ser considerada como problema de saúde pública?

- A) 60.
- B) 70.
- C) 80.
- D) 50.
- E) 90.

**43.** Entre os aspectos da reabilitação psicossocial, compreensão do sofrimento psíquico e interdisciplinaridade, assinale a alternativa correta.

- A) Os grupos de apoio para os diversos tipos de sofrimento psíquico existem, mas não trazem alívio e não ajudam as pessoas a modificarem seu comportamento habitual.
- B) Na avaliação da enfermagem devem ser abordados os padrões psicossociais e culturais do paciente, seu estilo de vida e suas atividades cotidianas.
- C) Na redução do estresse, as características biológicas e psicológicas de um indivíduo não são alteradas pelo contexto social e ambiental em que vive.
- D) Demonstrar compreensão e interesse, ouvir e conversar com o paciente são atividades dos psicólogos, cabendo ao enfermeiro a assistência nas funções fisiológicas.
- E) A forma de trabalho interdisciplinar dos profissionais de saúde, visando solucionar os problemas do paciente, não traz benefício na evolução terapêutica, devendo ser descartado esse modelo.

**44.** Em relação à atuação da enfermagem na Investigação Epidemiológica, todas as alternativas estão corretas, EXCETO:

- A) a participação da enfermagem nesse processo inicia-se na fase pré-diagnóstica e compreende a coleta de informações que possam auxiliar na detecção de doenças.
- B) a investigação é feita através da entrevista e do exame físico, para detectar presença de sinais e sintomas de doença, histórias progressas de doenças infecciosas e os tratamentos realizados.
- C) a atuação da enfermagem é fundamental quando a doença exige um tratamento prolongado ou adoção de novos hábitos e comportamentos, visando à recuperação do paciente.
- D) a enfermagem desenvolve atividades como controle de comunicantes, coleta de material e encaminhamento para exames laboratoriais, prova de sensibilidade e orientações sobre a quimioprofilaxia.
- E) nos casos de tratamento no domicílio, cabe ao médico e não à enfermagem orientar sobre o diagnóstico, a terapêutica medicamentosa e medidas higienodietéticas.

**45.** Entre as medidas básicas de prevenção das infecções hospitalares na assistência ao paciente, assinale a alternativa correta.

- A) As técnicas de descontaminação de tecidos vivos são importantíssimas na prevenção e no controle das infecções hospitalares, juntamente com os cuidados higiênicos com pacientes que vão sofrer intervenções cirúrgicas.
- B) O desequilíbrio dos mecanismos de defesa do paciente em relação aos microorganismos que habitam em sua pele e/ou mucosa, não influem na ocorrência de infecções hospitalares.
- C) A ocorrência de infecção em sítio cirúrgico não tem relação com o potencial de contaminação da cirurgia, e sim com a duração da mesma.
- D) O uso de técnica correta de assepsia entre os membros da equipe, no campo operatório e no paciente, não constituem uma medida importante para redução de infecção em ferida cirúrgica.
- E) A lavagem das mãos como medida preventiva das infecções respiratórias hospitalares não é considerada importante por o profissional estar protegido pelo uso de luva estéril.

**46.** Sobre a Violência contra a Mulher, assinale a alternativa correta.

- A) No ambiente domiciliar, não se constitui um problema de saúde pública.
- B) Adquiriu um caráter endêmico e converteu-se num problema de saúde pública em vários países.
- C) É legitimada pelos processos socioculturais da superioridade masculina, não podendo ser feita nada para mudar.
- D) Quando ocorre no espaço micros social não é tema de estudo para indicadores de saúde coletiva.
- E) Não deve ser motivo de denúncia à delegacia de polícia por terceiros.

**47.** Com relação à Atenção à Saúde da Criança, é correto afirmar que:

- A) aos quatro meses deve-se iniciar o processo de desmame de leite materno.
- B) no crescimento com curva de traçado ascendente deve-se pesquisar problema de saúde.
- C) o crescimento e desenvolvimento infantil são processos geneticamente programados, que independem de fatores ambientais.
- D) primeira infância é o período que vai do nascimento até o segundo ano de vida.
- E) a circunferência craniana alterada é indicativa de anormalidade do SNC.

**48.** Com relação à Atenção à Saúde do Idoso, assinale a alternativa correta.

- A) No homem idoso não ocorre diminuição da secreção androgênica e da capacidade reprodutiva.
- B) O peso, volume e número de néfrons nos rins não são alterados com o envelhecimento.
- C) O ambiente biopsicossocial em que o homem está inserido não tem influência no processo de envelhecimento.
- D) A prevalência do risco de osteoporose é maior no sexo masculino que no feminino.
- E) O processo de envelhecimento no idoso se caracteriza por modificações na estrutura e nas funções do corpo.

**49.** De acordo com o Código de Ética de Enfermagem, assinale, entre as atribuições abaixo, a de caráter privativo do enfermeiro:

- A) participação no planejamento, execução e avaliação da programação de saúde.
- B) participação em bancas examinadoras na área de saúde.
- C) prestação de assistência à parturiente e ao parto normal.
- D) direção do órgão de enfermagem pública ou privada.
- E) participação em projetos de construção ou reforma na área de saúde.

**50.** Sobre as recomendações para limpeza e desinfecção de artigos na Central de Material, é correto afirmar que:

- A) os artigos de uso respiratório são, de modo geral, classificados como semicríticos, podendo ser esterilizados ou receber desinfecção de alto nível.
- B) o objetivo da limpeza é reduzir a carga microbiana, eliminando os esporos e mantendo a vida útil do artigo.
- C) a lavadora ultra-sônica é um método efetivo de limpeza, não havendo necessidade de troca da água do equipamento, mesmo quando suja.
- D) a limpeza mecânica é executada através de fricção com escovas e uso de soluções enzimáticas.
- E) na desinfecção de artigos endoscópicos com soluções germicidas, deve-se enxaguar com água corrente, procedendo à secagem com uso de luva não estéril.