



Escola de Administração
Fazendária

**CONCURSO PÚBLICO PARA
ANALISTA DE CONTROLE EXTERNO
ACE - TCU - 2002**

Prova I

Especialidade: Medicina

INSTRUÇÕES

Nome: _____ Nº Inscrição: _____

- 1 - Escreva seu nome e número de inscrição, de forma legível, nos locais indicados.
- 2 - O CARTÃO DE RESPOSTAS não será substituído e deve ser assinado no seu verso.
- 3 - **DURAÇÃO DA PROVA: 3h30min**, incluído o tempo para preenchimento do CARTÃO DE RESPOSTAS.
- 4 - Neste caderno, as questões estão numeradas de **01 a 64**, seguindo-se a cada uma 5 (cinco) opções (respostas), precedidas das letras **a, b, c, d e e**.
- 5 - No CARTÃO DE RESPOSTAS, as questões estão representadas por seus respectivos números. Preencha, **FORTEMENTE**, com caneta esferográfica (tinta azul ou preta), **toda a área correspondente à opção de sua escolha**, sem ultrapassar seus limites.
- 6 - Não amasse nem dobre o CARTÃO DE RESPOSTAS; evite usar borracha.
- 7 - Será anulada a questão cuja resposta contiver emenda ou rasura, ou para a qual for assinalada mais de uma opção.
- 8 - Ao receber a ordem do Fiscal de Sala, confira este CADERNO com muita atenção, pois qualquer reclamação sobre o total de questões e/ou falhas na impressão não será aceita depois de iniciada a prova.
- 9 - Durante a prova, não será admitida qualquer espécie de consulta ou comunicação entre os candidatos, tampouco será permitido o uso de qualquer tipo de equipamento (calculadora, tel. celular etc.).
- 10 - Por motivo de segurança, somente durante os **trinta minutos que antecedem o término da prova**, poderão ser copiados os seus assinalamentos feitos no CARTÃO DE RESPOSTAS, conforme subitem 6.3.5 do edital.
- 11 - Entregue este CADERNO DE PROVA, juntamente com o CARTÃO DE RESPOSTAS, ao Fiscal de Sala, quando de sua saída, que não poderá ocorrer antes de decorrida uma hora do início da prova; a não-observância dessa exigência acarretará a sua exclusão do concurso.
- 12 - Os gabaritos serão divulgados de 8 a 10/7/2002, conforme subitem 8.3 do edital.
- 13 - Os recursos poderão ser interpostos até o dia 10/7/2002, conforme subitem 8.3.1 do edital.
- 14 - Este caderno de prova está assim constituído:

Disciplinas	Questões	Pesos
Conhecimentos Específicos em Clínica Médica	01 a 56	2
Controle Externo	57 a 64	1

Boa Prova

CONHECIMENTOS ESPECÍFICOS EM CLÍNICA MÉDICA

01- Uma paciente com 26 anos apresenta ao exame dermatológico máculas hipocrômicas localizadas nas nádegas, sendo descritas como coalescentes e de limites pouco precisos, não tendo apresentado resposta à pesquisa da sensibilidade térmica, dolorosa e tátil. Com base nestas informações, tem-se como provável diagnóstico:

- a) hanseníase
- b) vitiligo
- c) pitíriase versicolor
- d) sífilis
- e) candidíase

02- Muitas vezes as manifestações clínicas da rubéola são confundidas com as do sarampo. Neste caso, podem ser úteis para o diagnóstico de rubéola o encontro dos seguintes aspectos:

- língua em framboesa;
- manchas de Koplik;
- duração de 3 a 5 dias do exantema.

Marque a opção que tenha a sequência correta.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) F, V, V
- d) F, F, V
- e) F, F, F

03- Paciente com 18 anos procura o consultório com quadro de prurido cutâneo, pápulas eritematosas em tronco e membros superiores e edema bilateral bipalpebral. Tais sinais surgiram um dia após iniciar tratamento com antimicrobiano. Sobre esta condição clínica pode-se afirmar que:

- a) o aumento de IgE parece ser responsável pela gênese deste caso.
- b) provavelmente a imunidade celular encontra-se normal.
- c) há pouca associação com história familiar de asma.
- d) dermatografismo costuma estar ausente.
- e) corticosteróide é o tratamento de escolha.

04- Pacientes portadores de pielonefrite crônica em atividade podem não apresentar resposta ao uso de antibióticos mesmo quando o microorganismo é sensível ao fármaco prescrito. Esta situação pode ter como causa(s):

- presença de corpo estranho em vias urinárias;
- senilidade;
- existência de abscesso perinefrético.

Marque a opção que tenha a sequência correta.

- a) Sim, Sim, Sim
- b) Sim, Sim, Não
- c) Sim, Não, Sim
- d) Não, Não, Não
- e) Não, Sim, Não

05- Podem ser apontados como achados clínicos de uma síndrome urêmica, exceto:

- a) anemia
- b) prurido
- c) hipotermia
- d) hipotensão arterial
- e) anorexia

06- A insuficiência renal aguda pode apresentar diversas manifestações clínicas. Assinale o único achado semiológico que não faz parte do quadro.

- a) Impotência sexual
- b) Náusea
- c) Sinal de Kussmaul
- d) Sede
- e) Sinal de Kernig e Brudzinsky

07- O cálculo renal de oxalato de cálcio pode ter diversas causas. Assinale a única possibilidade incorreta.

- a) Hipercitratúria
- b) Hipomagnesúria
- c) Hiperuricosúria
- d) Hiperossalúria
- e) Aumento na produção de 1,25(OH)D₂

08- Quanto aos sintomas e complicações da doença de refluxo gastro-esofágico, assinale a opção correta.

- a) A regurgitação pode desencadear quadro de asma noturna.
- b) Disfagia raramente é encontrada nesta condição.
- c) A anemia verificada nestes casos é do tipo normocrômica e normocítica.
- d) A maioria dos pacientes apresenta tecido epitelial colunar no esôfago distal.
- e) Odinofagia freqüentemente indica o diagnóstico concomitante de câncer de esôfago.

09- Uma paciente de 45 anos procura atendimento médico em virtude de apresentar há 2 meses dor epigástrica em queimação, que surge 3 horas após as refeições e no período noturno. Tal sintoma melhora com a ingestão de alimentos ou com o uso de antiácidos. O exame físico revela apenas dor à palpação do epigástrio. Diante desta história clínica, avalie as seguintes afirmativas:

- A principal causa deste mal se deve ao desequilíbrio entre a produção de ácido e pepsina e a existência de fatores protetores da mucosa;
- A possibilidade de indicar cirurgia é de alta probabilidade;
- Infecção por *Helicobacter pylori* e uso de anti-inflamatórios devem ser pesquisados quando da elaboração do tratamento.

Marque a opção correta:

- a) V, V, V
- b) V, F, V
- c) F, F, V
- d) F, V, F
- e) F, F, F

10- Com relação à apresentação clínica da Doença Celíaca no adulto, assinale a única assertiva incorreta.

- a) A estomatite recorrente pode ser a sua única manifestação.
- b) A Esteatorréia é a apresentação clínica mais comum.
- c) Muitos adultos apresentam diarreia intermitente, flatulência e emagrecimento.
- d) A osteoporose é uma forma de apresentação comum da Doença Celíaca.
- e) Sintomas cerebelares são manifestações do Sistema Nervoso Central associadas à Doença Celíaca.

11- Um paciente apresenta história clínica compatível com Hepatite aguda e aumento de TGO e TGP. Indique o perfil sorológico para confirmar o diagnóstico de Hepatite pelo Vírus B.

- a) HbsAg, IgG anti-HBc
- b) IgG Anti-HBs, IgG anti-HBc
- c) IgG Anti-Hbe
- d) HBsAg, IgM anti-HBc
- e) IgM anti-Hbe

12- Uma avaliação cardiológica é realizada em um paciente de 35 anos sendo encontrado no segundo espaço intercostal esquerdo, frêmito sistólico e ausculta de sopro sistólico rude, propagando-se para a clavícula e base do pescoço direito, com abafamento da segunda bulha. O pulso apresentava-se pequeno e tardio. Trata-se de achados clínicos compatíveis com o diagnóstico de:

- a) insuficiência pulmonar
- b) estenose aórtica
- c) insuficiência aórtica
- d) estenose pulmonar
- e) insuficiência mitral

13- A Insuficiência Cardíaca Congestiva está associada com todos os sinais e sintomas descritos, exceto:

- a) Hiperfagia
- b) Oligúria
- c) Hemoptise
- d) Dor na região do hipocôndrio direito
- e) Respiração de Cheyne-Stokes

14- Sabe-se hoje que o diagnóstico e o tratamento precoce do infarto agudo do miocárdio reduzem de maneira significativa sua mortalidade. Dentro deste prisma, é muito importante identificar em que situação clínica encontra-se um paciente que apresente dor torácica de natureza isquêmica. Com relação às 3 principais síndromes que representam o espectro da doença é correto dizer que:

- Angina instável resulta de oclusão intermitente ao fluxo coronariano por parte de um trombo ali estabelecido;
- Infartos Q apresentam maior incidência de eventos cardíacos subseqüentes tais como re-infarto e morte;
- Infartos não Q tendem a ser maiores e associados com trombose mais prolongada e completa.

Marque a opção correta.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, F
- d) F, F, V
- e) F, F, F

15- Com relação à 3ª Bulha, assinale a única assertiva correta.

- a) Pode ser normal em indivíduo idoso.
- b) Na avaliação do ciclo cardíaco ela se localiza no período sistólico.
- c) Quando presente pode significar estenose mitral isolada grave.
- d) Constitui um som de alta frequência.
- e) É um achado característico da Insuficiência Ventricular Direita.

16- Existem evidências científicas que mostram que alguns medicamentos podem aumentar a sobrevida dos indivíduos que apresentam Insuficiência Cardíaca Congestiva, como é o caso do seguinte grupo de fármaco:

- a) Inibidor da fosfodiesterase
- b) Digitálico
- c) Dobutamina (infusão intermitente)
- d) Inibidor da enzima conversora da Angiotensina
- e) Dinitrato de isosorbida

17- Homem de 55 anos procura o Pronto-Socorro com forte dor torácica e evolui com Infarto Agudo do Miocárdio (IAM) anterior com onda Q não complicado. Não apresentou mais nenhum episódio de dor torácica. A prova de esforço pré-alta foi normal. A Ecocardiografia transtorácica identificou hipocinesia em parede anterior. Com relação aos mais importantes fatores prognósticos, assinale a única assertiva correta.

- a) Sexo
- b) Idade
- c) Disfunção de Ventrículo Esquerdo
- d) Presença de angina antecedendo o evento do IAM
- e) Taquicardia Sinusal

18- Aponte a anormalidade que não constitui critério para o diagnóstico de artrite reumatóide.

- a) Rigidez matinal.
- b) Comprometimento articular assimétrico.
- c) Nódulos subcutâneos.
- d) Edema de 3 ou mais articulações.
- e) Osteopenia periarticular nas mãos vista através de exame radiográfico.

19- Uma paciente de 26 anos recebe uma prescrição de Diclofenaco de Sódio para dar seguimento a tratamento de osteoartrite. São necessárias as seguintes recomendações para o correto uso do medicamento:

- sua administração é recomendada mesmo se a paciente estiver grávida ou amamentando;
- se ingerido juntamente com o alimento, ocorre uma redução de sua absorção;
- pode ocorrer sangramento intestinal mesmo com a dose mínima de 100 mg diárias.

Marque a opção correta.

- a) V, V, V
- b) V, F, V
- c) F, V, F
- d) F, F, V
- e) F, F, F

20- A evolução desfavorável da função renal no Lúpus Eritematoso Sistêmico está associada a diversos fatores preditivos. Assinale a única assertiva errada.

- a) Raça calcasiana.
- b) Tabagismo.
- c) Início do quadro na infância.
- d) Falta de aderência ao esquema terapêutico proposto.
- e) Hipertensão arterial.

21- A osteoporose pode ser diferenciada da Artrite Reumatóide através do seu quadro clínico. Assinale a única assertiva que possibilita essa diferenciação.

- a) Rigidez matutina com duração de 1 hora.
- b) Comprometimento da articulação interfalangeana proximal.
- c) Artralgia.
- d) Impotência funcional.
- e) Comprometimento da articulação interfalangeana distal.

22- A osteoporose é uma condição multifatorial. Assinale a condição que não está associada com o desenvolvimento de osteoporose.

- a) Uso crônico de corticosteróide.
- b) Deficiência de Vitamina D.
- c) Presença de hipogonadismo.
- d) Uso crônico de heparina.
- e) Hipoparatiroidismo.

23- Homem de 49 anos vem apresentando episódios de artralgia em mãos. O exame físico identificou a presença de nódulos de Bouchard e Heberden. Com relação ao diagnóstico, assinale a única assertiva correta.

- a) Fibromialgia
- b) Artrite Reumatóide
- c) Doença de Still
- d) Esclerodermia
- e) Osteoartrite

24- São condições que se caracterizam como indicativas da necessidade de se pesquisar Diabetes Mellitus:

- Obesidade;
- Infecções recorrentes de pele;
- Presença de outros fatores de risco para aterosclerose.

Marque a opção que tenha a sequência correta.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, F
- d) F, V, V
- e) F, F, V

25- Nas doenças da Tireóide existem diversos achados oculares; assinale o achado semiológico que não faz parte do quadro.

- a) Quemose
- b) Edema suborbitário
- c) Xantelasma
- d) Paresia óculo-motora
- e) Anisocoria

26- A obesidade é atualmente considerada problema de saúde pública no Brasil. Sobre as manifestações clínicas da obesidade é correto afirmar que:

- a) muitos problemas clínicos se devem à resistência à ação da insulina.
- b) o risco de apresentar câncer é semelhante ao das outras categorias populacionais.
- c) na obesidade severa a hiperventilação pode levar à insuficiência respiratória crônica.
- d) quadros hipertensivos pouco modificam o risco de ocorrer morte súbita.
- e) depressão e ansiedade quando ocorrem têm caráter predominantemente endógeno.

27- Anemia por deficiência de ferro é causa de freqüente procura ao consultório médico. A respeito deste assunto, avalie as seguintes afirmativas:

- Trata-se de um sinal clínico indicativo da existência de uma doença de base;
- A causa mais comum é a perda sangüínea;
- Atrofia das papilas da língua e estomatite angular são sinais de alta prevalência.

Marque a opção que tenha a seqüência correta.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, F
- d) F, V, V
- e) F, F, F

28- Um paciente com 18 anos de idade apresenta linfonodos em cadeia cervical de consistência endurecida e aderidos a planos profundos. Há um mês, observa febre recorrente e perda de peso. Biópsia realizada mostra a presença de células de Reed-Sternberg. Neste caso, o provável diagnóstico é o de:

- a) leucemia mielóide crônica.
- b) linfoma de Hodgkin.
- c) linfoma não Hodgkin.
- d) sarcoidose.
- e) tuberculose.

29- Mulher de 25 anos foi internada devido à icterícia de início recente. Apresentou quadro de infecção de Vias Aéreas Superiores há 2 semanas e 48h antes de ser internada apresentou escurecimento da urina. Exames complementares: Hb: 9,2 g/dL; Reticulócitos 6%, Urobilinogênio 2+; Bilirrubina sérica total 2,5 mg/dL; teste para bilirrubinúria negativo.

Assinale a única assertiva compatível com o diagnóstico.

- a) Anemia hemolítica auto-imune.
- b) Leptospirose.
- c) Hepatite Aguda pelo Vírus A.
- d) Doença de Wilson.
- e) Infecção pelo Hanta Vírus.

30- Mulher de 32 anos é encaminhada para avaliação de macrocitose. Assinale a única assertiva incorreta na avaliação desse caso.

- a) Em pacientes com VGM maior que 110 fL, ou nos casos < 110 fL mas que apresentem polineuropatia e disfunção cognitiva inexplicável está indicado a determinação dos níveis séricos de Ácido fólico e Vitamina B12.
- b) Deve ser investigado o uso de medicações como Fenitoína, Metotrexate e Zidovudina.
- c) A Hipersegmentação dos neutrófilos possui uma menor sensibilidade do que a dosagem plasmática de Vitamina B12 e Ácido fólico.
- d) O indivíduo portador de alfa-talassemia pode mascarar a presença de macrocitose.
- e) Uso crônico de bebida alcoólica é uma importante causa de macrocitose.

31- Uma paciente com 25 anos, gestante de 12 semanas, procura atendimento médico em virtude de apresentar quadro clínico constituído por dispnéia, tosse seca e chiados no peito há 2 semanas. Esta sintomatologia tem a freqüência de 3 vezes na semana e incide sempre no período da madrugada. Em nenhum momento foi preciso procurar assistência médica no Pronto-Socorro. O tratamento desta paciente deve envolver a adoção das seguintes medidas:

- controle ambiental;
- uso de B2 agonista para o momento das crises;
- uso de corticóide inalatório.

Marque a opção correta.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) F, F, F
- d) V, F, F
- e) F, V, V

32- Trata-se do agente etiológico mais provável em quadros de pneumonia comunitária:

- a) Legionella pneumophila
- b) Moraxella catarrhalis
- c) Staphylococcus aureus
- d) Pseudomonas aeruginosa
- e) Streptococcus pneumoniae

Responda às questões 33 e 34 após ler o texto a seguir:

Um paciente com 65 anos procura o consultório informando apresentar há 2 semanas tosse que drena secreção amarelada, dispnéia e chiados no peito. Tem antecedente de 50 anos de tabagismo, tendo fumado em média 20 cigarros por dia. O exame físico aponta para a presença de aumento da frequência respiratória, cianose de lábios e extremidades, sibilos e crepitações inspiratórias em bases pulmonares, presença de taquicardia e hiperfonese de segunda bulha em foco pulmonar e edema de membros inferiores. A radiografia de tórax mostra aumento da trama vasobrônquica e das câmaras cardíacas direitas. Uma gasometria arterial realizada revelou a existência de hipoxemia com hipercarbica.

33- A principal causa de descompensação clínica deste paciente deve-se a:

- a) insuficiência cardíaca
- b) infecção respiratória
- c) acidose respiratória
- d) tromboembolismo
- e) hiper-reatividade de vias aéreas

34- A principal iniciativa para controlar o quadro de insuficiência cardíaca direita é indicar o uso de:

- a) diurético
- b) antibiótico
- c) oxigênio
- d) heparina
- e) broncodilatador

35- Homem de 65 anos dá entrada no Pronto-Socorro com quadro de forte cefaléia. A avaliação neurológica identifica sinais focais, compatível com lesão do moto-neurônio superior, em dimídio esquerdo.

- a) O fator de risco mais importante para hemorragia cerebral espontânea é a hipertensão arterial.
- b) No idoso a angiopatia amiloide cerebral é um fator de risco importante para hemorragia intracerebral.
- c) A presença de ataxia, nistagmo e dismetria indicam lesão da região na cápsula interna, contra-lateral a lesão.

d) O uso de trombolíticos está formalmente contra-indicado, quando não é possível a realização de tomografia computadorizada de crânio.

e) Hemorragia cerebral devido a má-formação vascular é mais comum em indivíduos com menos de 40 anos.

36- Familiares de um senhor de 65 anos procuram um consultório de clínica médica preocupados com o fato de perceberem que o mesmo apresenta tremores nas mãos. O exame físico realizado mostra que o paciente apresenta uma fisionomia impassível e anda com o tronco e a cabeça inclinados para frente, passo acelerado e miúdo. Neste caso o diagnóstico mais provável é o de:

- a) Doença de Alzheimer
- b) Depressão
- c) Doença de Parkinson
- d) Espondilite anquilosante
- e) Acidente vascular cerebral

37- Paciente com 50 anos, portador de hipertensão arterial, procura assistência médica em virtude de apresentar há cerca de 12h quadro clínico constituído por desvio da comissura labial para a direita e paralisia dos músculos localizados na face esquerda. Diz estar muito preocupado com a possibilidade de ter sido acometido de um acidente vascular cerebral. Um aspecto que aponta para a possibilidade de tratar-se de uma paralisia facial periférica foi o fato de que ao franzir a testa, observou-se:

- a) pregas cutâneas nos dois lados da região frontal.
- b) pregas cutâneas apenas no lado direito da região frontal.
- c) pregas cutâneas apenas no lado esquerdo da região frontal.
- d) pregas cutâneas apenas no lado mediano da região frontal.
- e) a inexistência de pregas cutâneas na região frontal.

38- Uma paciente com 45 anos de idade procura o consultório médico referindo apresentar insônia há 4 semanas. Negou a existência de qualquer conflito de ordem emocional ou familiar. Neste caso, as seguintes atitudes podem ser tomadas:

- prescrever um hipnótico;
- pesquisar um distúrbio psíquico subjacente;
- adotar medidas higiênicas para o sono.

Marque a opção correta.

- a) V, V, V
- b) V, F, V
- c) V, V, F
- d) F, V, V
- e) F, F, V

39- Com relação à infecção pelo vírus da Dengue, assinale a assertiva incorreta.

- a) Infecção por Dengue causa uma doença cujo espectro inclui desde infecções inaparentes até quadros de hemorragia e choque, podendo evoluir para morte.
- b) A primeira manifestação é febre alta (39 a 40°C) e início súbito.
- c) A doença tem uma duração de 5 a 7 dias. Com o desaparecimento da febre, há regressão dos sinais e sintomas, podendo ainda persistir o cansaço.
- d) Os casos típicos de febre hemorrágica da Dengue são caracterizados por febre alta, hepatomegalia, insuficiência circulatória e fenômenos hemorrágicos.
- e) O achado laboratorial clássico é leucocitose com neutrofilia, anemia com macrocitose e discreta trombocitose.

40- Com relação à sintomatologia da enxaqueca, assinale a assertiva que não é característica do quadro.

- a) O ataque dura entre 4 a 72 horas.
- b) A osmofobia não faz parte do critério classificatório, mas é um sintoma muito característico.
- c) Cefaléia holocraniana.
- d) Náusea e vômitos.
- e) Dor com característica latejante.

41- Com o advento do aumento das doenças que promovem a depleção imunitária do indivíduo, o diagnóstico de estrogiloidíase tem assumido papel de grande relevância. A respeito desta parasitose pode-se afirmar que:

- a) a forma mais freqüente de contaminação se dá pela ingestão de água ou alimentos.
- b) predominam manifestações cutâneas nos quadros de hiperinfecções.
- c) a existência de eosinofilia é sinal de mau prognóstico.
- d) técnicas de diagnóstico devem levar em conta o termo e hidro-tropismo das larvas.
- e) Mebendazol é o tratamento de primeira escolha.

42- Com relação à Esquistossomose, assinale a assertiva incorreta.

- a) A esquistossomose aguda (febre da Katayama) é comum em áreas com alta taxa de infecção.
- b) A concomitância de esquistossomose com infecção crônica pelo Vírus B da Hepatite não representa maior risco para Hepatocarcinoma.
- c) A deposição dos ovos na parede do intestino pode induzir inflamação, hiperplasia, ulceração, microabscessos e polipose.
- d) A hepatomegalia reflete a presença de inflamação granulomatosa e ocorre numa fase precoce da infecção crônica.
- e) A Mielite Transversa é a complicação mais comum do Sistema Nervoso Central.

- 43- Com relação à infecção pelo Papiloma vírus humano, assinale a assertiva incorreta.
- a) No condiloma acuminado, observam-se lesões exofíticas, bem circunscritas, em pele ou mucosa.
 - b) A Epidermodisplasia verruciforme é uma doença rara que se caracteriza pela grande susceptibilidade em desenvolver infecção pelo HPV e carcinoma epidermóide.
 - c) Existe uma forte associação entre infecção pelo HPV e o desenvolvimento de doenças malignas no trato genital, ânus e reto.
 - d) As técnicas sorológicas para diagnosticar HPV são essenciais para a confirmação dessa infecção.
 - e) O exame de Papanicolau é a técnica citológica mais empregada na rotina, para detectar ou confirmar a infecção pelo HPV na cervix uterina e vagina.
- 44- Com relação à Leptospirose, assinale a assertiva incorreta.
- a) O período de incubação varia entre 2 e 30 dias, mas a maioria dos pacientes apresenta sintomatologia nos primeiros 5 a 10 dias.
 - b) A presença de esplenomegalia é um achado importante na maioria dos casos, ocorrendo em cerca de 98% dos casos.
 - c) A maioria dos casos inicia com cefaléia holocraniana súbita, dor retroocular, mialgia, febre alta, náusea, sufusão hemorrágica conjuntival e rash fugaz.
 - d) Nas formas leves a hemoptise pode ocorrer com resultado da hemorragia alveolar e intersticial. Nas formas mais graves, pode ocorrer edema pulmonar com lesão aguda pulmonar ou Síndrome de Angústia Respiratória do Adulto.
 - e) A Síndrome de Weil está associada com grave disfunção hepato-celular, intensa icterícia, hemorragias e alterações cardíacas, pulmonares, hemodinâmicas e neurológicas.
- 45- Diversas infecções podem comprometer diretamente o miocárdio ou pericárdio. Assinale a única assertiva incorreta.
- a) Leptospirose
 - b) Doença de Chagas
 - c) Amebíase
 - d) Hanseníase
 - e) Riquetsiose
- 46- Paciente que apresente dor à descompressão no ponto de MacBurney tem provavelmente o diagnóstico de:
- a) colecistite
 - b) pancreatite
 - c) úlcera péptica perfurada
 - d) pneumonia de lobo superior direito
 - e) apendicite
- 47- Todas as seguintes anormalidades são fatores de mau prognóstico na pancreatite aguda (critérios de Ranson), exceto:
- a) Esteatorréia
 - b) Hipocalcemia
 - c) Hiperglicemia
 - d) Acidose metabólica
 - e) Redução importante do Hematócrito
- 48- O prognóstico de um indivíduo que apresenta parada cardiorrespiratória depende em muito das medidas adotadas pela equipe de saúde que trata dessa emergência clínica. Nesse caso, a abordagem primária deve envolver em primeiro lugar:
- a) compressão torácica
 - b) acesso venoso
 - c) desfibrilação
 - d) ventilar com pressões positivas
 - e) abrir as vias aéreas
- 49- As manifestações clínicas do choque são variáveis. Assinale a única assertiva incorreta.
- a) A Hipotensão ocorre na maioria dos casos (PA sistólica < 90 mmHg).
 - b) Na fase inicial do choque séptico pode ocorrer hipoventilação.
 - c) Oligúria.
 - d) Alterações cutâneas: pele fria e viscosa.
 - e) Agitação, que pode progredir para confusão e delírio.

50- A alteração eletrocardiográfica mais precoce verificada em quadros de hiperpotassemia é a(o):

- a) alteração do QRS.
- b) alteração da onda P.
- c) alteração da onda T.
- d) bloqueio atrioventricular de 1º grau.
- e) aumento do intervalo QT.

51- Fazem parte dos critérios classificatórios de Depressão, exceto:

- a) Hiperfagia ou hiporexia
- b) Hipersomnia ou insônia
- c) Fadiga
- d) Agitação psicomotora
- e) Alucinações auditivas

52- Com relação ao câncer de mama, assinale a única assertiva incorreta.

- a) A probabilidade aumenta com a idade e é maior em mulheres com história familiar.
- b) O uso da mamografia é benéfico na investigação de câncer de mama em mulheres dos 50 aos 70 anos, visto que a sensibilidade do exame físico é baixa para excluir essa neoplasia.
- c) Múltiplos nódulos na mama aumentam a chance de neoplasia maligna para 95%.
- d) A ultra-sonografia pode ser útil para determinar se a lesão é cística ou sólida.
- e) A presença de gens BRCA-1 e BRCA-2 só ocorre em 5% dos casos.

53- Reconhecer o grau de dependência da nicotina por parte de uma pessoa que deseja parar de fumar é um passo decisivo para um possível sucesso no tratamento do tabagismo. Esta avaliação pode ser feita de acordo com o teste de Fangerström. Com base neste teste, os fatores que podem ser apontados como indicativos de que o fumante ativo apresenta dependência muito alta são:

- Fuma nos primeiros 5 minutos após acordar pela manhã;
- Fuma mais no período vespertino que nas outras horas do dia;
- Fuma mesmo doente, acamado.

Marque a opção que tenha a sequência correta.

- a) V, V, V
- b) V, V, F
- c) V, F, F
- d) F, F, F
- e) V, F, V

54- São manifestações clínicas iniciais decorrentes do uso de cocaína, exceto:

- a) midríase
- b) cefaléia
- c) alucinações
- d) sonolência
- e) hiperreflexia

55- Com relação ao tratamento da Síndrome de Secreção Inapropriada de ADH (SSIADH), assinale a única assertiva incorreta.

- a) O mais importante é a restrição hídrica e de sal.
- b) A taxa inicial de correção da hiponatremia dependerá da presença ou ausência de sinais neurológicos.
- c) O Lítio poderá ser empregado nos casos de hiponatremia refratária aos tratamentos convencionais.
- d) Muitos casos de SSIADH são transitórios, havendo normalização da osmolaridade e da hiponatremia após a resolução da doença de base (exemplo: Pneumonia, meningite e tuberculose).
- e) Outra opção terapêutica são os agonistas do receptor de vasopressina.

56- Com relação ao câncer de Próstata, assinale a assertiva incorreta.

- a) A biópsia prostática não está indicada quando o nível de PSA é maior que 10 ng/mL, mesmo se o exame de toque retal for normal.
- b) Início recente de disfunção erétil pode levantar a suspeita de câncer de próstata.
- c) Na presença de câncer de próstata, o nível normal de PSA (<4 ng/mL) indica uma alta probabilidade para que a neoplasia esteja restrita à glândula.
- d) Os sintomas mais comuns são urgência urinária, nictúria e polaciúria.
- e) A idade é o fator de risco mais importante. O câncer de próstata é raramente detectado antes dos 45 anos, mas a incidência de novos casos pode chegar a 900/100.000 acima dos 70 anos.

CONTROLE EXTERNO

57- O controle externo no Brasil, quanto à fiscalização contábil, financeira e orçamentária da Administração Pública Federal, atualmente, comporta atividades diversificadas, compreendidas na competência

- a) exclusiva do Congresso Nacional.
- b) exclusiva do Tribunal de Contas da União.
- c) conjugadas e conjuntas do Congresso Nacional e do Tribunal de Contas da União.
- d) privativas umas do Congresso Nacional e outras do Tribunal de Contas da União.
- e) privativas umas do Congresso Nacional, outras do Tribunal de Contas da União e algumas delas com a participação conjugada de ambos esses órgãos.

58- O Tribunal de Contas da União tem a natureza jurídica de um órgão

- a) legislativo
- b) judicante
- c) administrativo
- d) essencial à função judicante
- e) essencial à função legislativa

59- O Tribunal de Contas da União, mesmo no exercício das suas funções de controle externo e a despeito de haver irregularidades graves ou causas plausíveis que o recomendem, não poderá

- a) inabilitar o responsável seu jurisdicionado para o exercício de cargo comissionado na Administração Pública Federal.
- b) declarar a inidoneidade de licitante fraudador da competição licitatória.
- c) afastar temporariamente do exercício das suas funções o responsável seu jurisdicionado que possa dificultar apurações de fatos.
- d) decretar a indisponibilidade dos bens de responsável.
- e) determinar o arresto dos bens de responsável julgado em débito.

60- As decisões do Tribunal de Contas da União, de que resultem imputação de débito, conforme expressa previsão constitucional,

- a) terão eficácia de título executivo.
- b) terão eficácia executiva de título judicial.
- c) são exeqüíveis após inscrição como dívida ativa.
- d) são exeqüíveis pelo próprio Tribunal.
- e) são exeqüíveis na Procuradoria do Ministério Público junto ao Tribunal.

61- De decisão definitiva do Tribunal de Contas da União em processo de tomada de contas caberá recurso de revisão ao Plenário, sem efeito suspensivo, interposto uma só vez e por escrito pelo responsável, seus sucessores, ou pelo Ministério Público junto ao Tribunal, dentro do prazo de cinco anos, desde que fundado em erro de cálculo nas contas, falsidade ou insuficiência de documentos que servirem de fundamento para o acórdão recorrido.

- a) Correta a assertiva.
- b) Incorreta a assertiva, porque cabe o recurso de revisão, também, no caso da superveniência de documentos novos com eficácia sobre a prova produzida.
- c) Incorreta a assertiva, porque só o próprio responsável pode recorrer.
- d) Incorreta a assertiva, porque o recurso de revisão tem necessariamente efeito suspensivo.
- e) Incorreta a assertiva, porque o prazo é de dois anos.

62- A competência constitucional do Tribunal de Contas da União, para fiscalizar a aplicação de recursos financeiros da União repassados aos Estados e Municípios, compreende

- a) os dos chamados Fundos de Participação.
- b) os provenientes da arrecadação do Imposto de Renda retido na fonte pagadora.
- c) os provenientes da arrecadação do Imposto sobre Produtos Industrializados, na proporção dos valores das exportações.
- d) os decorrentes de convênios ou instrumentos congêneres.
- e) os de qualquer natureza, origem ou destinação.

63- O julgamento de regularidade das contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores públicos federais constitui uma função de controle externo, cujo exercício a Constituição confere

- a) ao Tribunal de Contas da União - TCU, em conjunto com o Congresso Nacional - CN.
- b) ao TCU, em conjunto com a Câmara dos Deputados.
- c) ao TCU em conjunto com o Senado Federal.
- d) ao TCU, privativamente.
- e) ao TCU, com recurso para o CN.

64- Entre as funções de controle externo da Administração Pública Federal exercidas em conjunto pelo Tribunal de Contas da União - TCU e Congresso Nacional - CN, inclui-se o exame e avaliação dos projetos e programas autorizados na Lei Orçamentária Anual, avaliando os seus resultados quanto à eficácia, eficiência e economicidade.

- a) Correta a assertiva.
- b) Incorreta a assertiva, porque essa competência é privativa do CN.
- c) Incorreta a assertiva, porque essa competência é privativa do TCU.
- d) Incorreta a assertiva, porque essa competência é privativa de uma Comissão Mista Especial prevista na Constituição.
- e) Incorreta a assertiva, porque isso é previsto na Constituição como sendo competência privativa do Sistema de Controle Interno.



ESAF