

# Concurso Público

## Secretaria de Saúde do Recife



Secretaria de Saúde do Recife



PREFEITURA DO  
**RECIFE**

## Odontólogo / Endodontia

### LEIA COM ATENÇÃO

- 01** - Só abra este caderno após ler todas as instruções e quando for autorizado pelos fiscais da sala.
- 02** - Preencha os dados pessoais.
- 03** - Autorizado o início da prova, verifique se este caderno contém 50 (cinquenta) questões. Se não estiver completo, exija outro do fiscal da sala.
- 04** - Todas as questões desta prova são de múltipla escolha, apresentando como resposta uma alternativa correta.
- 05** - Ao receber a folha de respostas, confira o nome da prova, seu nome e número de inscrição. Qualquer irregularidade observada, comunique imediatamente ao fiscal.
- 06** - Assinale a resposta de cada questão no corpo da prova e só depois transfira os resultados para a folha de respostas.
- 07** - Para marcar a folha de respostas, utilize apenas caneta esferográfica preta e faça as marcas de acordo com o modelo ( — ).  
**A marcação da folha de resposta é definitiva, não admitindo rasuras.**
- 08** - Só marque uma resposta para cada questão.
- 09** - **Não risque, não amasse, não dobre e não suje a folha de respostas pois isso poderá prejudicá-lo.**
- 10** - Se a Comissão verificar que a resposta de uma questão é dúbia ou inexistente, a questão será posteriormente anulada e os pontos a ela correspondentes distribuídos entre as demais.
- 11** - Os fiscais não estão autorizados a emitir opinião nem prestar esclarecimentos sobre o conteúdo das provas. Cabe única e exclusivamente ao candidato interpretar e decidir.

**Nome:** \_\_\_\_\_

**Inscrição:** \_\_\_\_\_

**Identidade:** \_\_\_\_\_

**Órgão Expedidor:** \_\_\_\_\_

**Assinatura:** \_\_\_\_\_

**COMISSÃO DE PROCESSOS  
SELETIVOS E TREINAMENTOS**



## Português

### TEXTO 1

#### O vício começa em casa

Uma pesquisa realizada pela Universidade Federal de São Paulo (Unifesp) com 213 adolescentes revelou um dado assustador: 80% deles experimentam bebida alcoólica pela primeira vez em companhia dos familiares quando tinham entre 9 e 13 anos. Em 40% dos casos, os pais eram alcoólatras. "O pai que chega em casa estressado e bebe para relaxar está passando ao filho a mensagem de que o álcool pode ser um alívio em situações difíceis", observa um psiquiatra. A propaganda também estimula o consumo de álcool, pois vincula a bebida ao glamour e à satisfação plena. De acordo com um relatório da Organização Mundial de Saúde, nos países europeus que aboliram os anúncios de bebidas alcoólicas houve redução de 16% do consumo. O Ministério da Saúde não planeja nenhuma campanha específica para tentar baixar o consumo de bebida. Uma pena.

(Revista *Cláudia*. São Paulo, ano 40, n.4, abr. 2001, p. 32).

**01.** Com base em aspectos gerais de sua compreensão, pode-se dizer que o texto acima:

- 1) escrito em linguagem formal, tece considerações que se apóiam em dados consistentes e na apreciação de especialista abalizado.
- 2) é inteiramente construído a partir de uma análise objetiva do tema, eximindo-se seu autor de qualquer observação pessoal.
- 3) poderia ilustrar a tese de que a formação do homem se sujeita também às contingências de vida a que ele se submete.
- 4) traz uma constatação de que o discurso publicitário, mesmo de forma sutil, constitui um veículo de valores éticos e sociais.
- 5) traz implícita uma crítica à política nacional de intervenção na tentativa de se alterar os padrões do comportamento social.
- 6) defende a idéia de que a satisfação plena da condição humana resulta de fatores inerentemente externos e eventuais.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3, 4 e 5 apenas
- B) 4 e 6 apenas
- C) 1, 3, 4 e 5 apenas
- D) 1, 2 e 6 apenas
- E) 1, 2, 3, 4, 5 e 6

**02.** O texto 1, em seu todo, deve ser interpretado como um texto:

- A) de caráter técnico-científico, com um propósito de divulgação, por isso, obviamente neutro e imparcial.
- B) de comentário, contendo sutis observações críticas, em torno de certos ardis a que a população está sujeita.
- C) apelativo, dirigido preferencialmente a um público jovem; daí o nível desprezioso e informal de sua abordagem.
- D) explicativo, em que o autor questiona a ética e a consistência de certas condutas políticas da publicidade.
- E) com função estética e, assim, deve ser entendido em sua dimensão predominantemente simbólica e polissêmica.

**03.** Em diferentes partes do texto, são estabelecidas relações semânticas de 'causa' e 'efeito', como aquelas que ligam:

- 1) os apelos publicitários e a liberdade de consumo.
- 2) a vivência familiar e a formação de hábitos.
- 3) a política pública e o comportamento social.
- 4) a pesquisa e os desvios comportamentais.

Estão corretas:

- A) 1, 2, 3 e 4
- B) 1, 2 e 3 apenas
- C) 1, 3, 4 apenas
- D) 2 e 4 apenas
- E) 3 e 4

**04.** Certas situações sociais exigem que se fale ou se escreva de acordo com a norma padrão da língua. Assinale a alternativa em que a concordância e a regência verbal dos seguintes enunciados estão segundo essas normas.

- A) No Brasil, 80% dos adolescentes se inicia prematuramente ao mundo das drogas.
- B) Nenhum dos familiares presentes se mostraram interessados em assistir à conferência sobre alcoolismo.
- C) O resultado das últimas pesquisas mostraram um dado assustador: a família cabe a maior responsabilidade.
- D) As causas do consumo excessivo e prematuro do álcool nunca foi suficientemente debatido. A quem se poderia responsabilizar?
- E) Qual das campanhas sobre alcoolismo pôde corresponder aos apelos de que a gravidade do problema se ressentir?

**05.** O sentido dos radicais e dos prefixos que aparecem destacados nas palavras seguintes estão corretamente indicados entre parênteses na alternativa:

- A) calorífero (que produz); anfíbio (de lado contrário)
- B) dicotomia (duplicidade); epiderme (posição superior)
- C) ignívoro (fogo); dispnéia (movimento para fora)
- D) piscicultura (alma); antípoda (ação contrária)
- E) anemógrafo (vento); democracia (liberdade).

## Sistema Único de Saúde (SUS)

### 06. São princípios do Sistema Único de Saúde (SUS):

- 1) universalidade de acesso aos serviços de saúde, em todos os níveis de assistência.
- 2) participação da comunidade.
- 3) igualdade de assistência à saúde, sem preconceitos ou privilégios de qualquer espécie.
- 4) integralidade da assistência, entendida como conjunto articulado e contínuo de ações e serviços preventivos e curativos, individuais e coletivos, exigidos para cada caso, em todos os níveis de complexidade do sistema.
- 5) descentralização político-administrativa, com direção única em cada esfera de governo.

Estão corretas:

- A) 1, 2 e 4 apenas
- B) 3, 4 e 5 apenas
- C) 2 e 4 apenas
- D) 1, 3 e 5 apenas
- E) 1, 2, 3, 4 e 5

### 07. A Lei Orgânica da Saúde, Lei 8.080 de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8.142 de 28 de dezembro de 1990 estabelecem, com relação ao financiamento e à gestão financeira do SUS, que:

- A) o orçamento da Previdência Social destinará ao SUS, de acordo com a receita estimada, os recursos necessários à realização de suas finalidades.
- B) os valores a serem transferidos pelo Governo Federal aos municípios obedecerão à lógica do pagamento por produção, aliado à consideração do perfil epidemiológico da população.
- C) as transferências intergovernamentais para a saúde serão distribuídas proporcionalmente ao número de habitantes.
- D) os recursos financeiros do SUS serão depositados em conta especial, em cada esfera de atuação, e movimentados sob fiscalização dos respectivos conselhos de saúde.
- E) a fim de receberem os recursos do Fundo Nacional de Saúde, para cobertura de ações e serviços de saúde, é suficiente que os municípios tenham Fundo de Saúde, Conselho de Saúde e Conferência de Saúde.

### 08. A Norma Operacional Básica da Assistência à Saúde – NOAS-SUS 01/01 - considera que a estratégia da Saúde da Família encontra-se em expansão e vem se consolidando como um eixo estruturante para a organização da atenção à saúde. Os Programas de Saúde da Família (PSF) e os Programas de Agentes Comunitários de Saúde (PACS), compõem o modelo assistencial, na perspectiva de:

- A) garantir os cuidados suficientes às necessidades da população, privilegiando a atenção básica e simplificando o modelo assistencial.
- B) privilegiar o modelo assistencialista de atenção à saúde, tendo o médico como sujeito central e fundamental no processo de saúde.
- C) funcionar como porta de entrada do sistema de saúde, articulando-se com a atenção secundária e terciária.

- D) responder ao perfil epidemiológico predominante no país, pelo qual o adocimento deve-se a problemas de saúde coletiva.
- E) estruturar os sistemas municipais de saúde, com base na predominância de níveis secundários de atenção.

### 09. De acordo com a Lei 8080/90, são da competência das três esferas de governo as ações abaixo citadas, exceto aquelas relacionadas:

- A) ao saneamento básico.
- B) à vigilância sanitária.
- C) à saúde do trabalhador.
- D) à vigilância epidemiológica.
- E) ao controle da natalidade.

### 10. A vigilância sanitária consiste em um conjunto de ações:

- A) capazes de eliminar, diminuir e prevenir riscos à saúde e de intervir nos problemas sanitários decorrentes do meio ambiente.
- B) destinadas à detecção de determinadas doenças que afetam as comunidades da periferia urbana.
- C) voltadas exclusivamente à fiscalização de alimentos destinados aos centros de distribuição.
- D) programadas para avaliação e controle do valor nutricional dos alimentos hortigranjeiros.
- E) destinadas à fiscalização do meio ambiente, sobretudo em regiões afetadas por grandes estiagens.

### 11. As ações previstas pela vigilância epidemiológica visam:

- A) obter a participação da comunidade na detecção dos problemas regionais de saúde.
- B) avaliar o impacto que as tecnologias provocam na saúde da população mais carente.
- C) recomendar e adotar medidas de prevenção de controle das doenças ou agravos.
- D) registrar e divulgar a descentralização dos serviços para os municípios.
- E) divulgar o potencial dos serviços de saúde existentes nas comunidades urbanas.

### 12. Em relação à saúde do trabalhador, a Lei 8080/90 contém atividades que abrangem:

- 1) recursos humanos destinados à proteção permanente do ambiente de trabalho.
- 2) estudos, pesquisas, avaliação e controle de riscos e agravos potenciais à saúde presentes em situações de trabalho.
- 3) assistência ao trabalhador vítima de acidente de trabalho.
- 4) avaliação do impacto que as tecnologias causam à saúde.
- 5) participação do Sindicato dos Trabalhadores na defesa dos mesmos, quando existir risco iminente de agravo à saúde.

Estão corretas apenas:

- A) 1, 3, 4 e 5
- B) 1, 2 e 5
- C) 1 e 4
- D) 2, 3 e 4
- E) 2, 3, 4 e 5

## Conhecimento Específico

- 13.** A lesão periapical que, mais provavelmente, conterá bactérias no seu interior é:
- o abscesso apical.
  - o cisto apical.
  - a granuloma apical.
  - o osteíte condensante.
  - a periodontite apical crônica.
- 14.** Qual das ocorrências abaixo apresenta maior probabilidade de resultar em danos severos à polpa (necrose)?
- Luxação lateral do dente
  - Fratura do esmalte-dentina
  - Fratura radicular do terço cervical do dente
  - Luxação com intrusão
  - Luxação concêntrica do dente.
- 15.** No tratamento ortodôntico, a reabsorção é mais predominante nos dentes:
- molares superiores.
  - molares inferiores.
  - premolares superiores.
  - premolares inferiores.
  - incisivos superiores.
- 16.** Dentre os materiais para retrobturação, aqueles que oferecem maiores vantagens são:
- amálgama e verniz cavitário.
  - resina composta e ionômero de vidro.
  - IRM ou EBA e MTA.
  - cimento de poliacrilato e MTA.
  - MTA e resina composta.
- 17.** Quais das propriedades abaixo são específicas de um cimento endodôntico ideal, quando comparado ao material obturador?
- Ser viscoso, quando misturado, e ter boa adesão às paredes do canal.
  - Contrair-se ao tomar presa
  - Não ser radiopaco
  - Poder provocar resposta imune nos tecidos periapicais
  - Não possuir adesividade às paredes do canal
- 18.** O canal ou ducto de Wharton está localizado nas glândulas salivares:
- parótidas.
  - submandibulares.
  - sublinguais.
  - de Von Ebner
  - palatinas.
- 19.** O esvaziamento do conteúdo da cavidade pulpar e a obturação dos canais radiculares são indicados na pulpíte:
- aguda, em fase reversível.
  - aguda, em fase irreversível.
  - aguda purulenta.
  - crônica ulcerada.
  - crônica hiperplásica.
- 20.** Em qual das situações abaixo deve-se recomendar o uso de antibióticos, associados ao tratamento local?
- Periodontite ou pericementite apical aguda
  - Abscesso dentoalveolar agudo (fase inicial)
  - Abscesso dentoalveolar agudo (em evolução)
  - Abscesso dentoalveolar agudo (evoluído)
  - Periodontite apical crônica
- 21.** As brocas indicadas para os procedimentos de abertura coronária são:
- Broca Transmetal cilíndrica.
  - Ponta diamantada esférica de intermediário longo.
  - Broca Endo-Z tronco cilindro cônica.
  - Broca em forma de roda.
  - Broca em forma de tronco-cônica, diamantada, sem corte na extremidade.
- Estão corretas apenas:
- 1, 2, 3 e 5
  - 1, 4 e 5
  - 2, 3 e 5
  - 1, 2 e 4
  - 2, 3 e 4
- 22.** Os grampos 14 e 14A são indicados para:
- molares inferiores direitos e superiores esquerdos.
  - molares com destruição coronária ou coroas expulsivas.
  - dentes anteriores conoides.
  - dentes posteriores com anatomia correta.
  - dentes anteriores e posteriores.
- 23.** Qual dos produtos abaixo é uma solução de hipoclorito de sódio, a 2,5% (equivalente a 25.000 ppm de Cl)?
- água sanitária
  - solução de Grossman
  - solução de Labarraque
  - solução de Milton
  - líquido de Dakin
- 24.** O primeiro pré-molar superior apresenta, mais comumente, a seguinte morfologia radicular:
- duas raízes diferenciadas.
  - duas raízes fusionadas com bifurcação no terço apical.
  - bifurcação apical.
  - unirradicular ou raízes fusionadas.
  - três raízes.
- 25.** A dicotomografia de Heckel de Almeida é uma manobra para facilitar a colocação do filme periapical na cavidade bucal e consiste em:
- dobrar os dois cantos do filme.
  - usar filme próprio para tratamento infantil.
  - dobrar o filme ao meio e mantê-lo assim com o auxílio de fita adesiva.
  - dar ao filme uma forma de arco.
  - dar ao filme uma forma de cilindro.

26. Em casos de patologia pulpar e periapical, a maior infiltração microbiana via túbulos dentinários ocorre:

- A) na dentina primária.
- B) na dentina secundária.
- C) na dentina terciária ou reparadora.
- D) nos tratos mortos da dentina.
- E) na fibrose pulpar.


27. Os fatores que alteram a morfologia das cavidades pulpares são:

- 1) deposição de dentina secundária.
- 2) deposição de dentina terciária ou reparativa.
- 3) aumento da cavidade pulpar com o avanço da idade.
- 4) reabsorção dentinária interna.

Estão corretas apenas:


- A) 3 e 4
- B) 2 e 4
- C) 1 e 2
- D) 1, 2 e 3
- E) 1, 2 e 4

28. Na representação da porção apical radicular, abaixo esquematizada, os aspectos anatômicos, o canal radicular, o canal cementário e o cimento são respectivamente:



- A) 1, 2, 3
- B) 2, 1, 3
- C) 3, 1, 2
- D) 1, 3, 2
- E) 2, 3, 1

29. A distribuição dos túbulos dentinários, do maior para o menor diâmetro, nos terços apical (1), médio (2) e cervical (3), ocorre em qual das seqüências abaixo?



- A) 1, 2, 3
- B) 1, 3, 2
- C) 2, 1, 3
- D) 2, 3, 1
- E) 3, 2, 1

30. Qual a resistência a agentes químicos - em ordem decrescente - dos seguintes microrganismos?

- A) vírus não-lipídicos, esporos, fungos e vírus lipídicos
- B) esporos, bacilo da tuberculose, fungos e vírus lipídicos
- C) bactérias vegetativas, fungos, esporos e vírus lipídicos
- D) vírus lipídicos, bactérias vegetativas, fungos e vírus não-lipídicos
- E) vírus lipídicos, vírus não-lipídicos, fungos e bactérias vegetativas

31. Para o aumento da resistência à remoção do cone de guta percha, no interior de um canal bem preparado, a instrumentação deve terminar:

- A) na limpeza além do ápice anatômico.
- B) na limpeza além do ápice radiográfico.
- C) no formato cilíndrico do canal.
- D) no diâmetro transversal mais estreito, no terço médio.
- E) no diâmetro transversal mais estreito, no terço apical.

32. A perfuração na área da furca é, freqüentemente, o resultado:

- A) de preparos excessivos no acesso radicular.
- B) do uso de limas Hedström.
- C) do uso excessivo de uma lima tipo K.
- D) do uso excessivo de um extirpa-nervos.
- E) de uma ocorrência natural.

33. Os cimentos de hidróxido de cálcio:

- A) apresentam biocompatibilidade.
- B) são irritantes para o tecido pulpar.
- C) evitam a dor pós-obturaçãõ.
- D) sempre provocam dor pós-operatória.
- E) são os únicos radiopacos.

- 34.** O primeiro molar inferior apresenta, quanto à morfologia, um quarto canal em:
- A) dois terços das vezes.
  - B) 50% das vezes.
  - C) 25% das vezes.
  - D) um terço das vezes.
  - E) mais de 90% das vezes.
- 35.** O quarto canal é normalmente visto na:
- A) raiz mesio-vestibular do primeiro molar superior.
  - B) raiz mesial do primeiro pré-molar superior.
  - C) raiz palatina do primeiro molar superior.
  - D) raiz disto-vestibular do primeiro molar superior.
  - E) raiz distal do primeiro molar inferior.
- 36.** Quanto às anotações da ficha dentária, é correto afirmar que:
- A) a alteração das anotações é proibida.
  - B) a alteração das anotações é permitida, se for datada.
  - C) adições nas anotações são proibidas.
  - D) adições nas anotações são permitidas, se forem datadas
  - E) não são permitidas anotações adicionais e alterações.
- 37.** O movimento dos fluidos no interior dos túbulos dentinários é conhecido como a:
- A) Teoria da hidrostática de Brännström.
  - B) Teoria da hidrodinâmica de Brännström.
  - C) Teoria hidráulica de Brewer.
  - D) Teoria osmótica de Brewer.
  - E) Teoria da deformação mecânica.
- 38.** O que predomina na zona de irritação pulpar são:
- A) bactérias.
  - B) células de inflamação crônica.
  - C) brotos capilares.
  - D) elementos necróticos.
  - E) formações de pus.
- 39.** Qual das situações abaixo caracteriza uma contra-indicação para o tratamento endodôntico?
- A) Infarto do miocárdio nos últimos seis meses.
  - B) Diabetes controlada.
  - C) AIDS em qualquer estágio.
  - D) Tuberculose na fase crônica.
  - E) Hepatite em qualquer estágio.
- 40.** Quanto à necessidade de tratamento endodôntico, os pacientes com AIDS patente:
- A) devem ser pré medicados com analgésicos e antibióticos.
  - B) apresentam menos problemas do que quando submetidos à exodontia.
  - C) apresentam mais riscos do que quando submetidos à exodontia.
  - D) devem ser medicados com psicoseção e antibióticos.
  - E) é um procedimento inevitável.
- 41.** O teste do anestésico é mais efetivo na localização diferencial da dor:
- A) no lado direito da face.
  - B) na mandíbula ou maxila.
  - C) nos dentes anteriores.
  - D) nos pré-molares superiores.
  - E) na arcada superior.
- 42.** Quando radiograficamente se acha uma área de suposta rarefação óssea, na região abaixo dos premolares inferiores, é provável que estejamos diante:
- A) do tórus mandibular.
  - B) da fratura radicular.
  - C) dos forames genianos.
  - D) do forame mentoniano.
  - E) do canal dentário inferior.
- 43.** Entre os testes para a verificação da vitalidade pulpar, o teste de cavidade:
- A) é o primeiro teste na seqüência do diagnóstico.
  - B) resulta geralmente em dor.
  - C) deve ser realizado com anestesia geral.
  - D) deve ser realizado com anestesia local.
  - E) deve ser realizado, quando os outros testes são inconclusivos.
- 44.** Em casos de polpas inflamadas, a anestesia é ineficaz devido:
- A) à diminuição do pH do tecido em volta do dente envolvido.
  - B) à disponibilidade maior de cátions pela ligação ao dente envolvido.
  - C) a uma proporção maior de bases livres na região infiltrada.
  - D) a uma proporção menor de ácidos livres na região infiltrada.
  - E) ao aumento no pH do tecido em volta do dente envolvido.
- 45.** Não é anestesiada pelo bloqueio do nervo infra-orbitário:
- A) a área do canino superior.
  - B) a área do premolar superior.
  - C) a área dos incisivos superiores.
  - D) a mucosa do palato.
  - E) a mucosa vestibular do canino ao incisivo.
- 46.** Os dentes são mais susceptíveis às manchas por tetraciclina, a partir:
- A) dos 4 meses de vida intra-uterina, até 8 anos de idade.
  - B) do nascimento até 7 anos de idade.
  - C) dos 7 meses de vida intra-uterina, até que os 3<sup>os</sup> molares estejam formados.
  - D) dos 4 anos de idade até o início da adolescência.
  - E) do início da adolescência até os 20 anos.

**47.** O pino intra-radicular serve principalmente para:

- A) aumentar a retenção da coroa.
- B) fortalecer o dente.
- C) distribuir as forças ao longo da raiz.
- D) reduzir o risco de fratura radicular.
- E) aumentar a resistência do material do núcleo.

**48.** O fenômeno de microinfiltração é maior quando se usa o núcleo:

- A) de resina composta.
- B) de amálgama.
- C) fundido.
- D) ionômero de vidro.
- E) de CERMET.

**49.** Nas cavidades bastante profundas (0,5mm ou menos de dentina, entre o assoalho da cavidade e a polpa), deve-se usar, como tipo de proteção pulpar:

- A) sistema adesivo + ionômero de vidro.
- B) ionômero de vidro + sistema adesivo.
- C) pó de hidróxido de cálcio + ionômero de vidro.
- D) cimento de hidróxido de cálcio + ionômero de vidro + sistema adesivo.
- E) solução de hidróxido de cálcio + ionômero de vidro + sistema adesivo.

**50.** No preparo para o tratamento, a recomendação para a cobertura profilática com antibióticos é a seguinte:

- A) Penicilina V em vez de Amoxicilina.
- B) Amoxicilina em vez de Penicilina V.
- C) Keflex em vez de Penicilina.
- D) Cefalosporina em vez de Eritromicina.
- E) Eritromicina em vez de Cefalosporina.